No. 42

Observation sur une tumeur considerable, ala partie moyenne et interne, de la cuisse reconnüe hernie crurale. par Mr Thochard chirurgien major de l'hopital militaire de belle isle en mer

---

Le nommé breton soldat au regiment de bretagne, infanterie comp.nie lieuten.te colonelle, entra dans cet hopital le 6 Xbre 1765 pour une tumeur grosse comme la forme d'un chapau, ala partie moyenne et interne de la cuisse Gauche, commencé il y avoit environ un an edemi, ce soldat avoit été envoyé par le chirurgien major de son regiment, a l'hopital de l'orient, ou le regiment etoit en garnison, le chirurgien en chef de cet hopital, luy appliqua les topiques capables de fondre ou d'attirer la tumeur a supuration, quand il la crut a ce dernier degré, il voulut en faire l'ouverture (c'est ce que le malade m'a dit et c'est ce qu'un de ses sergens et des soldats de la même compagnie m'ont confirmé,) cet apareil luy fit peur il demanda a sortir de cet hopital afin de s'embarquer par le premier batteau pour arriver a celuicy, ce que le regiment luy accordat non sans difficultés, en arrivant je le visitai l'aspect de cette tumeur m'interdit, pour le moment, tant a cause qu'elle me parroissoit schirreuse qu'a cause qu'elle étoit situé sur l'artere crurale, apres avoir bien examiné la tumeur; je commencai par les remede generaux, je netoyai la partie de toutes les impregnations emplastiques et onctueuse le mis a un regime mesuré, ensuite le pris d'aucune situation horisontale, la tete plus basse que le trone et celuicy plus bas que les hanches les genoux hauts pour voir s'il n'y avoit pas moyen de tenter la reduction, je luis fis faire usage de delayans et laxatifs, ensuite des astringens interne et externe parceque je devois croire eu egard au toucher de la tumeur, qui etoit molasse inegale et sans ondulation quelque contenu humerale ou heterogene,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 16 d 2 n° 59 h.1

tous ces signes me la firent juger hernie crurale, je perseverai si bien dans mon

prognostique que je mis en usage le remede du prieure de cabriere, pendant l'usage

de ces remedes je travaille en même tems a la reduction a la quelle je parvins

J'y appliquai aussitôt un emplâtre contra rupturam avec une pièce par dessus,

il y a lieu de presumer que cette tumeur dilatant le tissu celullaire intermediaire

entre la membrane commune des muscles et la peau, seroit descendue pour ainsi

dire jusqu'au genouil ou même plus bas si la nature des parties qui entrent en

cet article ne s'y fussent opposées, car les impulsions que luy causoient les efforts

de la respiration de la toux, de l'eternuement, des excretions laborieuses surtout

lorsqu'on est constipé, auroient determinée une partie des intestins a descendre le long

de la cuisse, par les efforts que les actions d'un corps grand, jeune, vigoureux

tel que ce soldat, peuvent occasionner, ce qu'il y a d'etonnant c'est que cet homme

ne se plaignoit jamais de coliques.

J'ay pris ensuite le parti de faire faire un bandage d'acier elastique avec un

ressort a boudins qui descend jusques sur l'endroit de l'issue des intestins,

un peu plus bas que les hernies crurales ordinaires, au bout de cette

branche il y a un ecusson sur lequel est attaché une pelote dans laquelle

il y a encore un autre ressort a spirale attachée a l'ecusson, pour appuyer

elastiquement sur l'orifice herniaire, afin de contrebalancer les mouvemens

des muscles abdominaux et de comprimer l'endroit lors de l'affaissement

ou de l'impulsion vers les parties herniaires, cette branche est attachée

sur la ceinture d'acier pour servir de point d'apui a la branche a ressort

comprimante l'orifice de la hernie, le reste du bandage est a l'ordinaire

avec une sous cuisse.

quand cet homme toussoit il sentoit un flux dans la tumeur ainsi qu'en faisant
d'autres mouvements de cette nature; quand je refoulois la tumeur vers l'endroit
de son orifice ce malade sentoit la respiration plus pressée le diaphragme se voutoit
par consequent du côté du thorax les entrailles pressoient aussi l'estomach, le ventre
de plat qu'il etoit avant grossissoit. je ne crois pas que cet accident ait été
occasionné par accidens externes mais plutot par un relachement ou disposition
naturelle, puisque la hanche, l'articulation de la cuisse les lombes avoient perdues
leurs ressorts; c'est pour cela que je crois que les astringens que j'ay employés n'etoient point
hors d'indication, le relachement etoit si grand que l'extremitté etoit plus longue de ce côté
ce qui occasionnoit la claudication mais depuis la rentrée des partie l'engourdissement
et une stupeur douloureuse qui l'accompagnoit a cessé depuis qu'il a son bandage
le membre s'est raffermit et ce soldat qui boitoit il y a 15 jours ne boitte plus
a present, si ses parties sont constamment reduites il est possible que cette voy soit fermée,
le sujet étant jeune, comme cela arrive dans les hernies ordinaires

Rochard

J'ay fait part a l'academie Royale de chirurgie de l'operation d'une hernie
crurale que je fis a une femme, c'etoit aussi du coté gauche en 8bre 1751
la tumeur descendoit tres bas, j'us baucoup de peine a detruire des adherences qui
avoisinoient les vaisseaux cruraux cette femme guerrit, ce fut monsieur andouillet
actuellement premier chirurgien du roy en survivance, qui me fit l'honneur de
repondre a cette observation, comme commissaire en cette partie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE